



מבצע החיסון "2 טיפות" חיסון חי-מוחלש - bOPV

הבהרות - 12.8.13

1. האם ניתן לחסן ילדים בבית בו יש נשים בהריון?

תשובה: אפשר לחסן ילדים המועמדים לחיסון חי-מוחלש (OPV) כאשר יש נשים בהריון בבית הן במועד החיסון והן לאחריו. חיסון האחים הגדולים ימנע את הדבקותם בנגיף הפוליו הפראי, וכך גם הילודים יהיו מוגנים.

2. האם מותר לחסן ילדים עם אחאחים בני פחות מחודשיים?

תשובה: אין מניעה מלחסן ילדים עם אחים מתחת לגיל חודשיים בבית. חיסון האחים הגדולים ימנע את הדבקותם בנגיף הפוליו הפראי, וכך גם התינוקות יהיו מוגנים. מומלצת שמירה על היגיינה אישית של כל בני הבית ע"י רחיצת ידיים עם מים וסבון, במשך לפחות 20 שניות, בפרט במצבים הבאים: לאחר שימוש בשירותים, לפני כל מגע עם מזון, וכן לפני ואחרי החלפת חיתול.

3. האם ילד עם ליקוי אימונולוגי יכול לשהות בקרבת ילדים שחוסנו בOPV (גן ילדים, כיתה)?

תשובה: כאשר ישנם ליקויים במצב האימונולוגי אנו ממליצים על השלמת סדרת החיסון הראשוני לילד עם הליקוי האימונולוגי ע"י לפחות 3 מנות חיסון מומת (IPV), זאת לפני חשיפה למחוסנים כלשהם שקיבלו חיסון חי-מוחלש (OPV).

כמו בשגרה, יש חשיבות על שמירת ההיגיינה האישית של כל בני הבית בהם יש מדוכא חיסון, ע"י רחיצת ידיים עם מים וסבון, במשך 20 שניות לפחות, בפרט במצבים הבאים: לאחר כל שימוש בשירותים, לפני כל מגע עם מזון, וכן לפני ואחרי החלפת חיתולים.

4. האם מותר לחסן ילד המטופל בתרופה העלולה לדכא את מערכת החיסון (כגון אימורן או מטוטרקסט)?

תשובה: אם לפי הערכת הרופא המטפל, המינון של התרופה אינו גורם לילד לדיכוי מערכת החיסון אז מותר לחסן את הילד בחיסון החי-מוחלש.

5. האם מותר לחסן ילד בבית בו אחד מבני הבית מטופל בתרופה העלולה לדכא את מערכת החיסון (כגון אימורן או מטוטרקסט)?

תשובה: אם לפי הערכת הרופא המטפל של ההורה, המינון של התרופה אינו גורם להורה לדיכוי מערכת החיסון, אז מותר לחסן את הילד בחיסון החי-מוחלש.



6. האם מותר לחסן ילד בבית בו אחד מבני הבית הינו ללא טחול?

תשובה: כן. זה אינו מצב של דיכוי חיסוני כמוגדר בפרק החיסון החי-מוחלש bOPV בתדריך החיסונים.

7. האם מותר לחסן ילד המטופל באופן קבוע בסטרואידים במשאף או מכשיר אינהלציה?

תשובה: אם לפי הערכת הרופא המטפל, הטיפול בסטרואידים אינו גורם לילד לפגיעה במערכת החיסון, אז ניתן לחסנו בחיסון החי-מוחלש.

8. האם אפשר לחסן ב- OPV ילד עם חסר ב- IGA?

תשובה: אם לפי הערכת הרופא המטפל, הילד אינו סובל מתופעות קליניות משמעותיות, אז ניתן לחסנו בחיסון החי-מוחלש.

9. האם מותר לחסן ילד בבית בו אחד מבני הבית סיים טיפול כימותרפי לפני מס' חדשים?

תשובה: על פי פרק " חיסון במצבים מיוחדים" בתדריך החיסונים, אפשר לחסן בתרכיב חי-מוחלש אדם בתום 3 חודשים מסיום טיפול מדכא חסינות. מכאן שניתן לחסן ילד בתרכיב חי-מוחלש אם חלפו 3 חודשים מסיום הטיפול הכימותרפי של ההורה.

10. האם אפשר לחסן ילד שיש לו קרוב משפחה מדוכא חיסון שאינו גר עימו באותו בית (לדוג' סבא מטופל בכימותרפיה)?

תשובה: ניתן לחסן את הילד, אך על המגע מדוכא החיסון (שאינו גר עימו באותו הבית) לא להתקרב פיזית למשך 6 שבועות למחוסן, על מנת שלא להפוך למגע הדוק-ביתי של המחוסן.

11. אם כבר חוסן ילד בחיסון החי-מוחלש ובביתו התגלה בן-בית מדוכא חיסון?

תשובה: אם כבר אירעה חשיפה ל-bOPV במסגרת אותו בית בו גר אדם שהוא מדוכא חיסון או נשא HIV, יש לצמצם עד כמה שניתן את המגע בין האדם מדוכא החיסון למחוסן ב-bOPV למשך 6 שבועות לאחר מתן החיסון כדי למנוע העברה פקלית-אורלית. הנחיות אלו כוללות גם הקפדה יתרה על ההיגיינה האישית של מדוכא החיסון ובני הבית, ע"י רחיצת ידיים עם מים וסבון, במשך 20 שניות לפחות, בפרט במצבים הבאים: לאחר כל שימוש בשירותים, לפני כל מגע עם מזון, וכן לפני ואחרי החלפת חיתולים. על מדוכא החיסון עצמו להימנע מהחלפת חיתולים במקבל החיסון החי-מוחלש.